

FACSETE

ADRIELE REGINA DOS SANTOS

**SÍNDROME DA COMBINAÇÃO: REABILITAÇÃO COM PRÓTESE TOTAL
SUPERIOR E PPR INFERIOR**

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

2018

ADRIELE REGINA DOS SANTOS

**SÍNDROME DA COMBINAÇÃO: REABILITAÇÃO COM PRÓTESE TOTAL
SUPERIOR E PPR INFERIOR**

Monografia apresentada ao Curso de Especialização *Lato Sensu* da FACSETE, como requisito parcial para conclusão do Curso de Prótese Dental.

Área de concentração: Prótese Dental.

Orientador: Luciano Pedrin Carvalho
Ferreira

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

2018

Santos, Adriele Regina

Síndrome da combinação: Reabilitação com
prótese total superior e PPR inferior / Adriele Regina
Santos, 2018.

32 f.

Orientador: Luciano Pedrin Carvalho Ferreira
Monografia (especialização) – Faculdade de
Tecnologia de Sete Lagoas, 2018.

1.Síndrome da combinação. 2. Prótese total. 3. Prótese
Parcial removível.

I.Título

II.Luciano Pedrin Carvalho Ferreira

FACSETE

Monografia intitulada “Síndrome da combinação: reabilitação com prótese total superior e PPR inferior” de autoria da aluna Adriele Regina dos Santos, aprovada pela banca examinadora constituída pelos seguintes professores:

Prof. Dr. Luciano Pedrin Carvalho Ferreira
FACSETE - Orientador

Prof. Ms. Luis Carlos Menezes Pires
FACSETE

Prof. Dr. Fabrício Magalhães

FACSETE

São José do Rio Preto, 07 de fevereiro de 2018.

RESUMO

A Síndrome da Combinação é uma condição patológica que foi descrita por Ellsworth Kelly, em 1972, observada em pacientes desdentados na parte superior e que apresentam somente dentes anteriores inferiores classificados como Classe I de Kennedy, estes, utilizando prótese total superior e parcial removível inferior. (. O processo se dá início pela acentuada perda óssea posterior na mandíbula, e reabsorção óssea na região anterior do rebordo superior, com consequente crescimento das tuberosidades, extrusão de dentes anteriores inferiores e hiperplasia papilar da mucosa do palato. Esses traços podem aparecer em conjunto ou não, e às vezes, associadas às características que Saunders descreveu como: discrepância de plano oclusal, perda da DVO, adaptação inadequada das próteses, reposicionamento anterior da mandíbula, alteração no periodonto e epúlides fissuradas. O paciente que possui a síndrome apresenta alteração na estética, fonética, função, e até mesmo DTM.

Atualmente, há diversas formas de tratamento que visam o contato oclusal posterior, para aumentar a estabilidade da prótese e minimizar somente o contato anterior. O objetivo desse trabalho é demonstrar as características clínicas e seu tratamento com prótese total superior e parcial inferior, devolvendo fonética, função, e estética para pacientes com Síndrome da Combinação.

Palavras-chave: Síndrome da Combinação; Prótese total superior; Prótese parcial inferior

ABSTRACT

The Syndrome of combination is a pathological condition that was described by Ellsworth Kelly, in 1972, observed in patients toothless on top and who have only lower anterior teeth classified as Class I to Kennedy, these, using upper dentures and removable partial lower. The process starts by severe bone loss later in the jaw, and resorption in the anterior region of the upper edge, with consequent growth of extrusion tuberosities, lower anterior teeth and papillary hyperplasia of the mucosa of the palate. These traits can appear in conjunction or not, and sometimes, associated with the characteristics that Saunders described as: discrepancy of occlusal plan, loss of the DVO, inadequate adaptation of the prosthesis, repositioning of the anterior mandible, alteration in the PERIODONTIUM and epúlides fissured. The patient who has the syndrome presents change in the esthetics, phonetics, function, and even DTM. These traits can appear in conjunction or not, and sometimes, associated with the characteristics that Saunders. Currently, there are several forms of treatment aimed at the occlusal contact later, to increase the stability of the prosthesis and minimize only the previous contact. The objective of this study is to demonstrate the clinical characteristics and its treatment with upper dentures and partial bottom, returning phonics, function, and aesthetics for patients with syndrome of the combination.

Keywords: Syndrome of combination; upper dentures; lower partial prosthesis

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	08
2. PROPOSIÇÃO	10
3. REVISÃO DE LITERATURA	11
3.1 Tratamento	14
3.2 Prótese parcial removível	16
3.3 Prótese total	17
4. DISCUSSÃO	19
5. CONCLUSÃO	22
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	23