

FACSETE

ANNA HELENA GOUVEIA BARBOSA

**MORDIDA ABERTA ANTERIOR DENTÁRIA, COM ÊNFASE NO HÁBITO DE
SUCÇÃO NÃO NUTRITIVA, TRATADA COM GRADE PALATINA**

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

2016

ANNA HELENA GOUVEIA BARBOSA

**MORDIDA ABERTA ANTERIOR DENTÁRIA, COM ÊNFASE NO HÁBITO DE
SUCÇÃO NÃO NUTRITIVA, TRATADA COM GRADE PALATINA**

Monografia apresentada ao curso de Especialização *Lato Sensu* da FACSETE como requisito parcial para conclusão do Curso de Especialização em Ortodontia.

Área de concentração: Ortodontia

Orientador: José Arnaldo Sousa Pires

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

2016

Barbosa, Anna Helena Gouveia

Mordida aberta anterior dentária, com ênfase no hábito de sucção não nutritiva, tratada com grade palatina / Anna Helena Gouveia Barbosa - 2016.

38 f.; il

Orientador: José Arnaldo Sousa Pires.

Monografia (Especialização) - Faculdade de Tecnologia de Sete Lagoas, 2016.

1. Mordida Aberta Anterior Dentária, com Ênfase no Hábito de Sucção não Nutritiva. 2. Grade Palatina.

I - Título

II - José Arnaldo Sousa Pires.

FACSETE

Monografia intitulada "***Mordida aberta anterior dentária, com ênfase no hábito de sucção não nutritiva, tratada com grade palatina***" de autoria da aluna Anna Helena Gouveia Barbosa, aprovada pela banca examinadora constituída pelos seguintes professores:

Prof. Me. José Arnaldo Sousa Pires
FACSETE – Orientador

Prof. Ma. Máira Ferreira Bóbbo
FACSETE

Prof.^a Esp. Luciana Bernardes Pires
FACSETE

São José do Rio Preto, 02 de Março de 2016.

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a Deus, minha família, amigos, meu amor e companheiro de todas as horas Enio Filho.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que contribuíram direta e indiretamente, com mais esse degrau em minha jornada.

“Devemos ser a transformação, que queremos no mundo.”

Mahatma Gandhi

RESUMO

A mordida aberta anterior é uma das maloclusões de maior comprometimento estético-funcional, além das alterações dentárias e esqueléticas. Sua etiologia está relacionada principalmente a hábitos deletérios como a sucção não nutritiva, como de dedo, chupetas e mamadeiras, estando mais associada a este fator etiológico na fase de dentição dicídua. O tratamento precoce evita que a maloclusão se agrave. Este estudo faz uma revisão da literatura sobre o tratamento da mordida aberta anterior dentária causada pelos hábitos de sucção não nutritiva com grade palatina, onde, são apresentados os fatores etiológicos envolvidos, os tipos de grade palatina utilizados, o tempo de tratamento o modo como é utilizado, assim como, apresentação de casos do uso do referido tratamento. O estudo concluiu que a grade palatina, seja ela fixa ou removível é o tratamento mais indicado no caso de mordida aberta anterior dentária causado por hábitos de sucção não nutritiva, pois, atua como dispositivo mecânico, inibidor do hábito, levando ao abandono do mesmo, o que faz com que a mordida seja corrigida, contudo, apesar de ambos os tipos de grade palatina apresentar os mesmo resultados, o uso da grade palatina fixa é o mais recomendado, por não depender da cooperação do paciente.

Palavras-chaves: Sucção não nutritiva; Grade palatina; Maloclusões.

ABSTRACT

The open bite malocclusion previous is one of most aesthetic and functional impairment, in addition to dental and skeletal changes. Its etiology is mainly related to deleterious habits such as non-nutritive sucking, such as finger, pacifiers and bottles, being more associated with this etiologic factor in dicídua teething. Early treatment prevents the malocclusion from becoming worse.

This study reviews the literature on the treatment of dental anterior open bite caused by non-nutritive sucking habits with palatal crib, which presents the etiologic factors involved, the types of palatal crib used, the treatment time the way it is used, as well as display cases the use of said treatment. The study concluded that the palatal crib, whether fixed or removable is the best treatment in the case of dental anterior open bite caused by non-nutritive sucking habits, therefore, acts as a mechanical device, habit inhibitor, leading to the abandonment of the same, which causes the bite to be corrected, however, although both types of palatal grid presenting the same results, the use of palatal fixed grid is recommended, not dependent on patient cooperation.

Keywords: Non-nutritive sucking; palatal crib; malocclusions.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Mordida aberta anterior a) Vista lateral b) Vista frontal	15
Figura 2: Sucção não nutritiva do polegar a) Sucção do polegar b) Aspecto morfológico da mordida aberta anterior causado pela sucção do polegar	18
Figura 3: Sucção não nutritiva dos dedos a) Sucção de vários dedos b) Aspecto morfológico da mordida aberta anterior causado pela sucção de vários dedos	18
Figura 4: Sucção não nutritiva de chupeta a) Sucção de chupeta b) Aspecto morfológico da mordida aberta anterior causado pela sucção de chupeta	18
Figura 5: Vista frontal de indivíduo com hipertrofia das amígdalas palatinas e respiração bucal	20
Figura 6: Interposição Lingual a) Interposição da língua b) Mordida aberta anterior resultante da interposição da língua.....	22
Figura 7: Padrão Facial a) Mesofacial b) Branquifacial c) Dólicofacial.....	24
Figura 8: Grade palatina fixa	30
Figura 9: Grade palatina removível	30
Figura 10: Mordida aberta anterior dentária causada por sucção digital	31
Figura 11: Grade palatina removível no tratamento da mordida aberta anterior	31
Figura 12: Correção da mordida após o tratamento e retirada da grade palatina	31

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	12
2. PROPOSIÇÃO	13
3. REVISÃO DA LITERATURA	14
3.1 Mordida aberta anterior	14
3.2 Fatores etiológicos.....	16
3.3 Diagnóstico.....	24
3.4 Tratamento.....	26
4. DISCUSSÃO	33
5. CONCLUSÃO	35
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	36